

“L'Echange”, Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC, Rédacteur

---

*Opuscula martialia*


IX

(22 Février 1943)

MOULINS

“ LES IMPRIMERIES RÉUNIES ”

15, RUE D'ENGHIEN, 15



01 02 10



Les *types* des nouveautés de ce fascicule sont tous dans la collection Pic. Les formes des Indes Méridionales proviennent en majeure partie des districts de Tanjore ou de Salem et ont été capturées par le récolteur P. Nathan.

**Cyrtoclytus capra v. n. obliteratus** [Long.]. Fascia prima lutea elytrorum indistincta. Sibérie.

**Perissus clavicornis v. n. luteopubescens** [Long.]. Elongatus, parallelus, luteo pubescens, elytris ad medium arcuate nigrofasciatis, antice bi et postice uni nigro maculatis. Chine.

**Xylotrechus chinensis v. n. griseofasciatus**. Elytris brevibus, medio rufis, griseo trifasciatis, fasciis primis obliquis, tertia transversalis et angustata, membris rufis, femoribus pro parte nigris. Chine.

**Rhaphuma albosignata** n. sp. [Long.]. Elongatus, niger, capite thoraceque paulo griseo pubescentibus, elytris in singulo signaturis albis ornatis : linea humeralis ad basin caudata et prolongata, macula infra humeros externa, fascia promediana arcuata antice ad suturam longe prolongata, fascia postmediana angusta, ad suturam antice et postice prolongata, macula apicalis completa ; infra corpore lateraliter albo notato. Long. 13-15 mill. Java. — A placer près de *conformis* Gah.

**R. impressiceps** n. sp. Elongatus, niger, membris pro parte elytrisque rufescentibus, his ad humeros obscuris, postice in disco brunneo maculatis ; capite antice late biimpresso. Long. 12 mill. Chine. — A placer près de *insignaticollis* Pic.

**R. diversevittata** n. sp. Parum brevis, niger, luteo pubescens, thorace quinque nigro vittato, vittis laterali-bus sinuatis, antice junctis, elytris antice nigro trivittatis,

vittis postice aut externe junctis, ante apicem nigro maculatis. Long. 9 mill. Chine. — Rappelle par son dessin élytral celui de *C. annularis* F.

**R. minuta** n. sp. Elongatus, parallelus, niger, luteo pubescens, membris pro majore parte rufis; thorace in disco nigro bivittato, lateraliter nigro bimaculato, maculis connexis, elytris antice reducte nigro bilineatis, linea interna extus curvata, postice reducte nigro unilineatis, linea postice et externe curvata, fascia premediana nigra arcuata, antice ad suturam prolongata. Long. 8 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, plus étroit, dessins noirs différents.

**Demonax Rollei** n. sp. [Long.]. Elongatus, postice paulo attenuatus, niger, griseo pubescens, thorace subglobuloso, medio vage transverse nigro fasciato, elytris cinereis, antice et externe nigromaculatis, macula antice paulo incisa, ad medium et ante apicem transverse nigro fasciatis; articulo 4° antennarum dentato. Long. 7 mill. Bornéo. — A placer près de *octavus* Aur.

**D. X-signatus** n. sp. Parum elongatus, niger, griseo pubescens, elytris ad basin griseo notatis, antice reducte griseo bifasciatis, fasciis subarcuatis aut obliquis, ad suturam junctis, fascia grisea transversa postmediana ad suturam dilatata et macula apicalis grisea. Long. 8 mill. Bornéo. — Voisin du précédent, dessins des élytres différents et particuliers.

**Perissus luteonotatus** n. sp. [Long.]. Minutus, angustatus, nitidus, niger, parum dense griseo pubescens, elytris in singulo signaturis luteis ornatis: maculis duabus basalibus et connexis, fascia mediana valde obliqua, ad scutellum intus remota, fascia postmediana ad suturam remota, elytris apice vage luteis. Long. 6 mill. ? Chine. — A placer près de *clavicornis* Pic.

**Clorophorus annularis v. n. subnebulosus**, Sat robustus, griseo pubescens, signaturis piceis ut in forma typica ornatus, membris pro parte rufescentibus. Hanoï.

**Aridæus thoracicus v. n. humeralis** [Long.]. Niger, capite, thorace medio et reducte, antennis et pedibus pro parte rufis, elytris luteis, ad humeros nigro maculatis, antice et ad basin arcuate nigro fasciatis et post medium oblique nigro fasciatis. Australie.

**Falsomonohammus** n. g. [Long.]. Groupe des Monohammidés de Lacordaire et par ses yeux se rapprochant de *Mimolochus* Ths., genre caractérisé par les pattes, antérieures surtout, longues, le scape très échancré, les antennes très longues, ayant leurs premiers articles nettement et inégalement ponctués, assez rapprochées, le thorax muni de callosités discales lisses, les épaules un peu granuleuses ; il est établi pour l'espèce suivante.

**F. diverseglabratus** n. sp. Elongatus, postice attenuatus, niger, griseo-luteo pubescens, supra signaturis glabris diverse ornatus, capite et thorace lateraliter late nigro vitatis, humeris nigris, elytris multi et diverse glabro nigro maculatis, apice truncatis et breve angulatis ; pygidio paulo prominulo. Long. 15 mill. Annam.

**Stibara sexmaculata** n. sp. [Long.]. Parum elongatus, sat brevis, nitidus, rufus, capite in vertice uni et thorace transverse quinque nigro maculatis, elytris nigris, ad basin rufis, fortiter et multi lineato punctatis, pectore pro parte, pygidio, antennis, tibiis pro parte tarsisque nigris. Long. 13 mill. Bengale (ex coll. Buquet). — Peut se placer près de *humeralis* Ths.

**S. bipartitipennis** n. sp. Angustatus, testaceus, capite, antennis, dimidio postice elytrorum, tibiis tarsisque nigris. Long. 12 mill. ? Tonkin. — Plus allongé que le précédent, coloration de l'avant-corps différente.

**S. Beloni v. n. pallidior.** Late testaceus, elytris externe paulo obscuris, multi et diverse lineato punctatis. Tonkin.

**Idgia bicoloriceps** n. sp. [Mal.]. Angustatus, nitidus, testaceus, capite inter oculos minute, elytris apice breve, femoribus apice, tibiis et tarsis nigris; antennis parum gracilibus, articulo ultimo elongato, sinuato; pedibus non gracilibus. Long. 8 mill. Indes MÉR. — Voisin de *assimilis* Hope.

**I. curticeps** mihi, des Indes, de coloration analogue au précédent, a la tête plus courte et noire, les antennes sont plus ou moins noires avec la base rousse.

*Mecynotarsus tenuipes* Chp. varie par les élytres à coloration générale foncée (*v. obscurior*), ou claire (*v. pallidior*). — Japon.

**Mecynotarsus trinotatus** n. sp. [Héter.]. Parum elongatus, nitidus, sparse pubescens, rufus aut testaceus, elytris in singulo ad basin, ad medium externe et postice in disco nigro-piceo maculatis, membris flavis. Long. 2,5 mill. Indes MÉR. — Voisin de *bimaculatus* Pic, moins large et coloration foncière des élytres claire.

**Anthicus flavicolor** n. sp. [Héter.]. Elongatus, parum nitidus, breve et sparse pubescens, testaceus, pedibus flavis; capite postice truncato, dense punctato; thorace sat breve, antice dilatato-rotundato, medio sulcato, dense punctato; elytris elongatis, parum fortiter non dense punctatis. Long. 3 mill. Indes MÉR. — Ressemble à l'espèce paléarctique *sellatus* Panz.

**A. longesulcatus** n. sp., des Indes MÉR., voisin du précédent, de coloration générale claire, avec les élytres marqués de foncé sur le disque vers le milieu de chaque; se distingue, en outre, de *flavicolor* par la tête an-

gulée derrière les yeux, les élytres plus atténués en arrière.

**Pseudoleptaleus minimus** n. sp. [Héter.]. Minutus, elongatus, nitidus, paulo pubescens, testaceus, capite robusto, postice subarcuato ; thorace parum punctato, antice valde dilatato-rotundato, postice angustiore et paulo strangulato ; elytris elongatis, ad medium paulo latioribus, minute et sparse punctatis. Long. 2 mill. Indes MÉR. — A placer près de *aspericollis* Kr., coloration moins foncée, élytres moins élargis, etc...

**P. brunneofasciatus** n. sp. Elongatus, depressus, nitidus, minute, capite fortiore punctatus, parum pubescens, testaceus, elytris ad medium brunneo fasciatis et ad basin minute brunneo maculatis. Long. 2,5 mill. Indes MÉR. — Peut se placer près de *subnudus* Kr., coloration différente.

**P. humeralis** n. sp. Elongatus, nitidus, minute punctatus, parum pubescens, testaceus, elytris nigris, ad basin late flavis, humeris nigris. Long. 2,5 mill. Indes MÉR. — Diffère du précédent par la coloration, le thorax plus bombé.

**Hylophilus Nathani** n. sp. [Héter.]. Subopacus, griseo-holosericeo pubescens, rufus, femoribus posticis pro parte piceis ; capite thoraceque dense et minute punctatis, capite latiore, oculis griseis, maximis ; antennis gracilibus et elongatis ; elytris parum latis, sat brevibus, postice attenuatis, antice valde impressis, parum fortiter et sparse punctatis ; pedibus parum elongatis, femoribus posticis paulo crassis. Long. 1,5 mill. Indes MÉR. — Sans doute voisin de *subrufus* Chp.

**H. subrobustus** n. sp., des Indes MÉR., de 3 mill., ressemble à *rufotestaceus* Pic, il a une coloration générale

roussâtre avec, base exceptée, les élytres foncés ; ceux-ci ont une impression antérieure nette et une petite dépression suturale au-delà du milieu, l'avant-corps est opaque et les élytres sont un peu brillants, les pattes longues et assez grêles.

**H. Drescheri** n. p. Oblongus, nitidus, sparse griseo pubescens, rufus aut testaceus, capite nigro, elytris in singulo ad basin et ad medium piceo maculatis, femoribus posticis pro parte brunneis ; capite postice truncato, lato, oculis griseis, maximis ; antennis sat robustis, articulo ultimo latiore, truncato ; thorace subquadrato, dense punctato ; elytris ad humeros impressis, fortiter et dense punctatis ; pedibus 4 posticis validis, tibiis diverse sinuatis. Long. 2 mill. Java. — Voisin de *nigromaculatus* Pic.

**H. Tixieri** n. sp. Oblongus, minutus, nitidus, sparse griseo pubescens, testaceus, unicolor, oculis griseis ; capite truncato, thorace paulo latiore, illo breve et lato, fortiter sat dense punctato, oculis sat grandis, distantibus ; elytris brevibus, postice attenuatis, ad humeros impressis, fortiter punctatis. Long. 1,5 mill. Sumatra. — Plus robuste que le précédent, avec les élytres immaculés.

**H. undulatofasciatus** n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, pro parte dense albo pubescens, piceus, membris testaceis, oculis nigris ; capite thoraceque dense albo pubescentibus, capite inter oculos piceo notato ; thorace medio piceo signato ; elytris in singulo ad basin et in disco antice piceo maculatis et post medium piceo-undulato fasciatis, fasciis ad suturam junctis. Long. 2,5 mill. Guadeloupe. — Ressemble à *H. multinotatus* Pic, dessins des élytres différents et forme moins large.

**Malachiomimus laticeps** n. sp. [Mal.]. Elongatus, parallelus, nitidus, viride cupreus, antennis (flabellatis) ad



basin pedibusque pro parte testaceis ; capite thorace latiore, oculis maximis ; thorace breve, lateraliter subarcuato, irregulariter punctato ; elytris marginatis, ad humeros et ad suturam postice impressis, sat minute et dense punctatis, Long. 2-2,3 mill. Indes MÉR. — Peut se placer près de *latifrons* Chp.

**Calochromus bicoloripes** n. sp. [Mal.]. Angustatus, rubro-testaceus, infra corpore pro parte; antennis, articulis primis exceptis, geniculis intermediis et posticis, tibiis posticis pro parte tarsisque diverse nigris, elytris apice breve nigro notatis ; thorace inæquale, medio sulcato, lateraliter fortiter impresso. Long. 7-10 mill. Indes MÉR. — Diffère de *testaceipes* Pic par les pattes non entièrement claires, les antennes noires à partir du 3<sup>e</sup> article, robustes et moins longues.

**Plateros Nathani** n. sp. [Mal.]. Elongatus, niger, supra aurantiacus, luteo pubescens, antennis depressis, late dentatis ; thorace parum lato, antice arcuato, medio, antice excepto, late sulcato, lateraliter valde impresso ; elytris elongatis, multi costulatis, intervallis diverse punctato-fenestratis. Long. 7 mill. Indes MÉR. — A placer près de *peguensis* Pic.

**Ditoneces laticollis** n. sp. [Mal.]. Elongatus, parum pubescens, aurantiacus, antennis rufo-brunneis, gracilibus, longe flabellatis ; thorace valde transverso, lateraliter impresso, medio antice carinulato ; elytris elongatis, postice vage piceo marginatis. Long. 7 mill. Bornéo. — Caractérisé par son thorax particulier, plus large que d'ordinaire par rapport à la longueur.

**Scirtes nigromaculatus** [Helod.]. Oblongo-subovatus, parum nitidus, luteus, supra multi et diverse nigro maculatis, oculis nigris, antennis piceis, ad basin flavis ; thorace breve, valde transverso, reducte piceo-maculato, mi-

nute punctato ; elytris paulo marginatis, sat fortiter punctatis, in singulo diverse nigro novem maculatis ; macula 1<sup>a</sup> basalis reducta, 2<sup>a</sup> transversa, 3-6 triangulariter dispositis ad medium, 7,8 rotundatis, post medium oblique dispositis, 9<sup>a</sup> discoidalis et anteapicalis. Long. 4 mill. Indes MÉR. — Espèce caractérisée par ses nombreuses macules noires.

**Metholcus minutissimus** n. sp. [Anob.]. Subcylindricus, nitidus, minute punctatus, griseo pubescens, testaceus, oculis nigris, distantibus ; thorace breve, lateraliter fere recto ; elytris parum elongatis, postice attenuatis, substriatis. Long. 1 mill. Indes MÉR. — Caractérisé par sa très petite taille.

**Trichodesma multinotata** n. sp. [Anob.]. Parum elongatus, hirsutus, niger, pro parte dense luteo pubescens, thorace dense pubescente, diverse sex (2, 4) fulvo maculato ; elytris in singulo ad basin bi et ante medium transverse quadri nigro-piceo maculatis, ad medium late et sinuate nigro fasciatis, ante apicem ad suturam transverse nigro maculatis, membris paulo rufescentibus. Long. 7 mill. Indes MÉR. — Jolie espèce, voisine de *regalis* Pic, avec les dessins foncés plus nombreux.

**T. innotata** n. sp. Sat latus, hirsutus, niger, pro parte dense griseo pubescens, elytris insignatis. Long. 5 mill. Birmanie. — Caractérisé par l'absence de dessins noirs sur les élytres.

**Clada inhumeralis** n. sp. [Anob.]. Elongatus, opacus, nigro-piceus aut rufescens, uniformiter griseo pubescens, scutello dense albo pubescente, elytris in singulo quadri costatis, costis postice pro parte junctis, antennis testaceis, elongatis, breve pectinatis. Long. 7 mill. Tanganyka. — Voisin de *humeralis* Pic, élytres plus allongés, thorax plus large par rapport aux élytres.

**Clada rufescens** n. sp. Parum latus, sat brevis, rufescens, pro parte griseo pubescens, elytris indistincte lineato pubescentibus, antennis testaceis, flabellatis. Long. 5 mill. Cochinchine. — Plus petit que *lineata* Pic et sans bandes nettes aux élytres.

**Hedobia (Pseudoclada) latipennis** n. sp. [Anob.]. Latus, rufo-brunnescens, griseo pubescens, elytris latis, brevibus, in singulo 4-costatis, costis pubescentibus, intermediis apice junctis, antennis rufis, parum crassis. Long. 4 mill. Maroc. — Se distingue de *5-costatis* Schils. par les élytres plus courts et plus larges, les antennes plus fortes.

**Xyletinus paulostriatus** n. sp. [Anob.]. Oblongo-elongatus, postice paulo attenuatus, griseo pubescens, minute punctatus, rufus; thorace robusto, valde convexo, lateraliter fere recto; elytris parum elongatis, minute striatis. Long. 3 mill. Indes MÉR. — Faciès de *Lasioderma* St., caractérisé par ses élytres faiblement striés.

**X. Fouqueti** n. sp., de Pondichéry, voisin du précédent, de coloration analogue, plus petit et plus allongé, avec le thorax moins étroit latéralement, les stries des élytres s'effaçant en partie postérieurement.

**Gastrallus multistriatus** n. sp. [Anob.]. Angustatus, subopacus, griseo-holosericeo pubescens, testaceus; thorace postice latiore, paulo sat régulièrement convexo; elytris minute, multi et diverse striatis. Long. 2 mill. Indes MÉR. — A placer près de *birmanicus* Pic.

**Anobium marginaticolle** n. sp. [Anob.]. Elongatus, parallelus, griseo pubescens, subopacus, niger aut brunnescens; thorace sat breve et lato, lateraliter late marginato; elytris apice attenuatis, striato-punctatis. Long. 3 mill. Bombay. — Espèce bien caractérisée par son thorax largement explané sur les côtés.

**Ernobius indicus** n. sp. [Anob.]. Oblongo-elongatus, griseo pubescens, rufus ; articulis primis antennarum parum elongatis, tribus ultimis elongatis et nigris ; thorace elytris angustiore, breve, antice attenuato, dense punctato, lateraliter impresso. Long. 5,5 mill. Sikkim. — Voisin de *cedri* Chob.

**Mesocœlopus Alluaudi** n. sp. [Anob.]. Oblongus, robustus, convexus, griseo pubescens, parum nitidus, rufescens ; thorace valde convexo, antice deplanato, minute punctato ; elytris latis et brevibus, apice attenuatis, rugulosis, lateraliter reducte bistriatis, stria externa antice obliterated, interna posticata et parum distincta. Long. 1,5 mill. Diégo-Suarez. — Voisin de *madecassus* Pic, plus petit et stries des élytres différentes.

**M. subelongatus** n. sp. Parum elongatus, antice et postice attenuatus, griseo pubescens, nitidus, rufus ; thorace parum breve, lateraliter fere recto ; elytris longe attenuatis, minute et sparse punctatis. Long. 2 mill. ? Sénégal. — Très distinct de *minutus* Pic et autres africains par sa forme.

**M. grandis** n. sp. Oblongus, dense punctatus, rufescens, membris pallidioribus. Long. 4,5 mill. Zanzibar. — Caractérisé par sa grande taille.

**Lasioderma japonica** n. sp. [Anob.] Oblongus, nitidus, griseo-luteo pubescens, minute punctatus, rufescens, pro parte obscurus, infra corpore pallidior, oculis griseis, parum grandis. Long. 9 mill. Japon. — Peut se placer près de *serricornis* F., qui est plus régulièrement coloré.

**L. formosana** n. sp. Oblongus, postice paulo attenuatus, nitidus, griseo pubescens, minute punctatus, rufus ; thorace transverso, lateraliter arcuato ; oculis minutis.

Long. 2,5 mill. Formose. — A placer près de *serri-corne* F.

**L. robusta** n. sp. Robustus, parum nitidus, griseo pubescens, minute et dense punctatus, rufo-brunnescens ; elytris postice paulo attenuatis ; oculis maximis, non prominulis. Long. 5,5 mill. ; larg. 1,5. Madagascar — Voisin de *Raffrayi* Pic, thorax plus court, non un peu relevé en avant.

**Attagenus unifasciatus** n. sp. [Clav.]. Elongatus, subparallelus, dense punctatus, paulo sparse griseo pubescens, parum nitidus, niger, elytris ante medium reducte rufo fasciatis. Long. 4 mill. Afr. Australe. — Caractérisé par la présence d'une seule fascie rousse.

**A. apicalis** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, thorace fulvo aut griseo pubescente, elytris fulvo aut griseo pubescentibus, ad basin griseo subfasciatis, ante et post medium sinuate griseo fasciatis, apice paulo rufescentibus. Long. 3 mill. Erythrée. — A placer près de *fasciato-punctatus* Reitt.

**A. asmaranus** n. sp., de l'Erythrée, voisin du précédent, a l'avant-corps densément pubescent de gris, les élytres ont deux larges fascies grises, la première sinuée remonte sur la suture et entoure l'écusson, la 2<sup>e</sup>, subtransversale, s'unit en partie à une macule apicale de même pubescence, les membres sont testacés.

**A. amurensis** n. sp. Oblongus, nitidus, minute parum dense punctatus, pro parte griseo pubescens, niger, membris testaceis ; thorace lateraliter et postice deniore pubescente ; elytris ad basin pro parte dense pubescentibus. Long. 5 mill. Sibérie. — A placer près de *japonicus* Reitter.

**A. sikkimensis** n. sp. Oblongus, nitidus, parum pu-

bescens, niger, elytris membrisque rufis ; thorace lateraliter subarcuato, minute punctato ; elytris sat latis, parum elongatis, postice attenuatis, antice paulo depressis, minute sat sparse punctatis. Long. 5 mill. Sikkim. — Diffère de *rufithorax* Pic par la forme plus élargie, le thorax foncé.

**A. insignatus** n. sp. Oblongus, nitidus, minute punctatus, uniformiter parum dense luteo pubescens, rufus, capite aliquot obscuriore. Long. 4,5 mill. Abyssinie. — Diffère au moins de *dichrous* Roth. par le thorax roux.


**A. Madoni** n. sp. Oblongus, minutus, dense et uniformiter luteo pubescens, nigro-olivaceus, elytris apice rufis aut olivaceis, membrisque rufis. Long. 2-2,5 mill. Sénégal. — Voisin de *Donckieri* Pic, en diffère par le revêtement uniforme.

**Trogoderma rufonotatum** n. sp. [Clav.]. Oblongus, nitidus, sparse griseo pubescens, semi-hirsutus, sat minute et sparse punctatus, elytris rufis, in disco et antice nigro notatis, membrisque rufis. Long. 2,3 mill. Pérou. — Caractérisé par sa particulière coloration élytrale.

**T. submarginatum** n. sp., de la R.-Argentine, voisin du précédent, est noir en dessus, avec une bordure rousse assez large, s'effaçant en avant, le thorax est court et large, la forme plus parallèle, le dessus déprimé, la ponctuation plus fine.

**T. unifasciatum** n. sp. Oblongus, parum latus, nitidus, griseo pubescens, minute parum dense punctatus, niger, elytris ante medium arcuate rufo fasciatis, membrisque rufis. Long. 4 mill. Indes. — Caractérisé par ses élytres avec une seule fascie rousse.

**Telopes uninotatus** n. sp. [Clav.]. Minutus, oblongus, postice attenuatus, griseo pubescens, nitidus, minute



elytris fortiore sat dense punctatus, niger, elytris postice in disco rufo maculatis. Long. 2 mill. Afrique Or. — Caractérisé par sa petite taille et les élytres unimaculés de roux.

**Lema malabarensis** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, rufus, elytris cyaneis, antennis, articulis primis exceptis, tibiis pro parte tardisque nigris; thorace breve, unisulcato, antice non angulato; elytris brevibus; lineato-punctatis, postice paulo sulcatis. Long. 5 mill. Malabar. — Voisin de *malabarica* Jac., mais sommet des élytres foncé.

**L. externevittata** n. sp. Oblongus, minutus, parum nitidus, rufus, elytris ad suturam et externe, apice excepto, nigro metallicis, infra corpore pro parte nigro; thorace sat breve, unisulcato, antice paulo angulato; elytris sat brevibus, lineato-punctatis, postice paulo sulcatis. Long. 4 mill. Indes MÉR. — Peut se placer près de *trifasciata* Jac.

**L. brevesuturalis** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, supra rufus, elytris ad suturam et ad medium late viride notatis, membris nigris; tibiis intermediis curvatis, apice dilatatis. Long. 6 mill. Tonkin. — Voisin de *cyaneosuturalis* Pic.

**L. metallicoapicalis** nov. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, capite antice nigro, elytris apice parum late cyaneo violaceis; thorace breve, bisulcato, antice paulo angulato; elytris sat brevibus, antice paulo impressis, lineato-punctatis, punctis antice latioribus. Long. 5 mill. Indes MÉR. — Peut être simple var. de *præusta* F.

**L. viridithorax** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, supra viridis, membris nigris; thorace breve, bisulcato, antice angulato; elytris parum brevibus, antice impressis, linea-

to-punctatis, postice paulo striatis. Long. 7 mill. Indes MÉR. — Voisin de *Binghami* Jac., caractérisé par la coloration verte du dessus du corps.

**Scelodonta albopectoralis** n. sp. [Phyt.]. Minutus, oblongus, postice attenuatus, nitidus, æneo-cupreus, elytris parum distincte violaceo notatis; thorace infra et pectore dense albo pubescentibus; capite subalutaceo, fortiter non dense punctato; thorace transverse plicato; elytris latis et brevibus, postice valde attenuatis, humeris paulo prominulis, antice paulo impressis, diverse lineato-punctatis; femoribus minute dentatis. Long. 3 mill. Indes MÉR. — Peut se placer près de *indica* Duv., caractérisé par la densité de la pubescence sur la poitrine.

**Colasposoma pilosum** n. sp. Latus, æneus, supra et infra albo pubescens; capite thoraceque minute non dense punctatis, illo valde transverso; elytris antice paulo impressis, parum fortiter aut minute punctatis, externe non plicatis. Long. 5 mill. Indes MÉR. — Voisin de *albovillosum* Duv.

**C. ruficornis** n. sp. Oblongus, postice attenuatus, supra glaber, viridis, labro et membris rufis; capite thoraceque minute et sparse punctatis; elytris antice paulum impressis, irregulariter punctatis et pro parte plicatis. Long. 5-5,5 mill. Indes MÉR. — Diffère au moins de *rufipes* Jac. par l'abdomen foncé.

**C. rufofemoralis** nov., des Indes, voisin du précédent dont il paraît être une variété, a le dessus vert avec une bordure cuivreuse ou pourprée aux élytres, les pattes sont diversement foncées avec les cuisses au moins en partie rousses.

**C. arcuateimpressum** n. sp. Robustus, valde convexus, supra glaber, viridis, pro parte aureo et cyaneo



tinctus, antennis nigris ; capite postice thoraceque parum fortiter et sparse punctatis, implicatis. Long. 8 mill. Indes MÉR. — Peut se placer près de *asperatum* Lef., s'en distingue par le manque de sculpture particulière sur les côtés des élytres.

**C. Nathani** mihi, des Indes MÉR., ressemble au précédent, sa coloration est verte sans partie dorée, la taille est plus petite, le thorax est un peu impressionné de chaque côté, la ponctuation en partie plus forte avec les élytres ayant de nombreux plis sur les côtés.

**Pseudoclytra externesignata** n. sp. [Phyt.]. Elongatus, nitidus, niger, supra rufus, elytris post medium externe nigro notatis, membris nigris, antennis ad basin rufis. Long. 8 mill. Indes MÉR. — Diffère de *plagiata* Duv. par le dessin noir raccourci des élytres.

*Clytra Nathani* Pic. Espèce variable. La forme typique a quatre macules sur chaque élytre disposées 2 à 2 (la description doit être complétée des mots *et ad medium* sautés à l'impression) ; la var. nov. **paulosignata** a 3 macules, 1 humérale et 2 après le milieu ; la var. nov. **postfasciata** a les élytres ornés seulement d'une fascie postérieure raccourcie noires. Indes MÉR.

**C. subfasciata** v. nov. **octonotata**. Elytris rufis, in singulo nigro quadri (2, 2) maculatis. Indes.

**C. subopacipennis** n. sp. Elongatus, fere opacus, niger, elytris testaceis, post medium nigro fasciatis et apice arcuate nigro marginatis. Long. 10-11 mill. Indes MÉR. — Se distingue de *succincta* Lac. par l'aspect non brillant.

**C. Bonneuili** n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, elytris in singulo ante et post medium paulo oblique nigro bimaculatis, infra corpore nigro. Long. 6 mill. Indes. — Cette espèce et les deux suivantes sont voisines.

**C. brevipennis** n. sp. Sat latus et brevis, nitidus, rufo-testaceus, elytris in singulo ante medium viride bimaculatis et postice irregulariter viride fasciatis. Long. 6 mill. Indes MÉR. — Caractérisé par sa forme robuste.

**C. brevipennis v. nov. octomaculata.** Elytris in singulo quadri (2, 2) nigro-viride maculatis, infra corpore pro parte nigro. Indes.

**C. uninotata** n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, elytris postice externe nigro maculatis, antennis nigris, ad basin rufis, pectore pro parte nigro. Long. 5 mill. Indes MÉR. — Très caractérisé par sa particulière coloration.

**Diapromorpha unifasciata** n. sp. [Phyt.]. Subcylindricus, nitidus, niger, elytris testaceis, postice nigro fasciatis. Long. 8 mill. Indes MÉR. — Ressemble à *balteata* Jac., mais peu atténué postérieurement.

**Ætheomorpha externesignata** n. sp. [Phyt.]. Oblongo-elongatus, nitidus, rufus, elytris in singulo externe et postice reducte nigro lineatis, ad humeros nigro maculatis. Long. 4 mill. Indes MÉR. — A placer près de *nigromarginata* Jac.

**Ceratobasis innotatithorax** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, infra niger, supra rufus et nigro maculatus, capite ad oculos breve nigro; elytris in singulo et in disco ante et post medium late nigro maculatis (*forma typica*), aut postice solum maculatis (*v. nov. imbasalis*); antennis ad basin pedibusque testaceis. Long. 5 mill. Indes. — Voisin de *nair* Lac., mais thorax sans macules foncées, dessous noir.

M. PIC.

Autorisation Pb 810

Moulins, Les Imprimeries Réunies. C. O. du Livre 31.0097

